

泌尿器科

<<尿路上皮癌>>

レジメン名

CDDP+GEM療法 (d1, 8, 15)

<1コース>

3週投与1週休薬 (4週を1コースとする)

薬剤名	投与量	計算量	実投与量	投与スケジュール
抗がん剤 (点滴)				1 2 3 ... 8 15 22 29(1)
ゲムシタビン注 (200/1000mg) GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	↓ ↓ ↓ 休 ↓
シスプラチン注 (10/25/50mg) CDDP	70mg/m <sup>2</sup>	mg	mg	↓
前投与剤 (点滴)				1 2 3 ... 8 15 22 29(1)
デキサート注 (6.6mg)	6.6mg (day1.8)	6.6mg	mg	↓ ↓ ↓ ↓
デキサート注 (6.6/1.65mg)	9.9mg (day2)	9.9mg	mg	↓
アロキシ注0.75mg	1V (day2)	1V	v	↓
利尿剤 (点滴)				1 2 3 ... 8 15 22 29(1)
20%マンニトール注 (day2)	300mL (day2)	300mL	V	↓
内服				1 2 3 4 5 8 15 22 29(1)
アプレピタントカプセル (day2~4)	125mg 80mg	125mg 80mg	125mg 80mg	↓ ↓ ↓
デカドロン錠0.5mg (day3~5)	8mg/日 2× day3~	8mg/日	mg/日	↓ ↓ ↓