

外科

《大腸癌》

レジメン名

IRIS + パニツムマブ療法

< 1コース >

イリノテカン + ベクテビックス day1, 15投与、TS-1 day1-14 2週内服 (4週を1クールとする)

薬剤名	投与量	投与スケジュール
抗がん剤(点滴)		1 2 3 4 5 ..8.. ..15.. ..22· 29(1)
ベクティビックス p-mab (100mg)	6mg /kg	↓ 休 ↓ 休 ↓
イリノテカン CPT-11(40/100mg)	125mg/m ²	↓ 休 ↓ 休 ↓
抗がん剤(自宅で内服)		1 2 3 4 5 ..8.. ..15.. ..22· 29(1)
TS-1(内服) 1日2回	40~60mg/m ² /回(※下記参照) ※1.25m ² 未満 40mg/回 1.25~1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回	14 —————▶ 休 休 14
前投与剤		1 2 3 4 5 ..8.. ..15.. ..22· 29(1)
デキサート(1.65/6.6mg)	6.6mg	↓ ↓ ↓
グラニセトロン1mg (生食50mL バッグ)	1mg	↓ ↓ ↓
自宅で内服		1 2 3 4 5 ..8.. ..15.. ..22· 29(1)
デカドロン錠(1錠=0.5mg)	1日2回 1回4mg(8錠)	3 → →