

外科

《がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する  
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌》

レジメン名

**BEACON 3剤 レジメン**  
**セツキシマブ(Cet) + エンコラフェニブ(ENCO)**  
**+ ビニメチニブ(BINI)療法**

<1コース> 1週間

アービタックス<sup>®</sup>:1週間毎、ビラフトビ<sup>®</sup> 1日1回 連日 休薬なし、メクトビ<sup>®</sup> 1日2回 休薬なし

薬剤名	レジメン量	投与スケジュール
		1 8 15 22 ...
アービタックス <sup>®</sup> 注100mg (セツキシマブ:Cet)	初回 400mg/m <sup>2</sup> 2回目~250mg/m <sup>2</sup>	↓ ↓ ↓ ↓
前投与剤		1 8 15 22 ...
ポララミン <sup>®</sup> 注	1A	↓ ↓ ↓ ↓
デキサート注6.6mg	6.6mg	↓ ↓ ↓ ↓
自宅で内服		1 8 15 22 ...
ビラフトビ <sup>®</sup> 錠 50/75mg (エンコラフェニブ:ENCO)	1回300mg 1日 1回	連日 →
メクトビ <sup>®</sup> 錠15mg (ビニメチニブ:BINI)	1回45mg 1日 2回	連日 →