

外科

《 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 》

レジメン名

<1コース>

**XELIRI + BEV療法**

3週 1クール

| 薬剤名                       | レジメン量   | 投与スケジュール                          |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 抗がん薬                      |   | 1 2 3 4 .....14...21 22(1) 2 3 .. |
| ペバシズマブBS(100/400mg)       | 7.5mg/kg  | ↓ ↓                               |
| イリノテカン注(40/100mg)         | 200mg/m <sup>2</sup>  | ↓ ↓                               |
| 前投与剤                      |   |                                   |
| グラニセロンバッグ1mg              | 1本  | ↓ ↓                               |
| デキサート注(1.65/6.6mg)        | 6.6mg   | ↓ ↓                               |
| 内服抗がん薬                    |   | 1 2 3 4 .....14...21 22(1) 2 3 .. |
| カペシタビン錠 300mg             | 1回 800mg/m <sup>2</sup> 1日2回<br>1.31m <sup>2</sup> 未満 1回 900mg<br>1.31以上1.69m <sup>2</sup> 未満 1回1200mg<br>1.69m <sup>2</sup> 以上2.07m <sup>2</sup> 未満 1回1500mg<br>2.07m <sup>2</sup> 以上 1回1800mg | 14 → 休 14 →                       |
| 帰宅後内服(制吐薬)                |   | 1 2 3 4 .....14...21 22(1) 2 3 .. |
| デカドロン <sup>®</sup> 錠0.5mg | 8mg/日 2×  | 3 → 3 →                           |