

患者番号：

患者氏名：

様 心臓カテーテル検査・治療又は下肢血管造影の日程表

循環器担当医：

受持医：

月/日	指示日	入院(検査・治療前日)	検査・治療日		退院
			検査・治療前	検査・治療後	
月/日	/	/	/	/	/
観察		・足の甲と手首の動脈に印をつけます	・足の甲と手首の動脈の確認をします	・検査・治療後は経時的に全身状態の確認をします	・全身状態の確認をします
治療 処置		・身長・体重を測ります	・点滴を始める前に浴衣式の寝巻きに着替えます ・足の付け根からの検査・治療、治療の場合は尿の管を入れることができます ・下肢からの検査・治療、治療の場合、病衣に着替えてください	検査で終了した場合4時間後まで心電図モニターを装着します 治療した場合は翌日の医師の診察後まで心電図モニターを装着します	
点滴 注射 内服	・薬の確認と説明があります	・薬の確認と説明があります ・腎機能障害がある方は点滴が始まります	・インスリン注射は検査・治療が午前中の方は朝のみ中止 午後の方は朝・昼中止します ・検査・治療のおよそ1時間前から点滴します	・その後点滴終了です ・腎機能障害のある方は翌日まで点滴します	
検査・治療	・採血、胸部レントゲン、心電図、心エコー検査・治療、 四肢血圧測定、24時間心電図(必要時)		・心臓カテーテル検査・治療または下肢血管造影	・検診終了後、特に異常なければ後から食事が食べられます	
食事		・塩分制限食です	水、お茶は飲んでかまいません		
活動		・自由です	検査・治療室に車いす又はベッドで行きます 検査・治療入室前にトイレは済ませてください	○腕からの検査・治療 車椅子で病室に戻ります ・検査・治療後よりトイレまで歩行ができます ・(4時間後・6時間後)後に止血を解除します その後は病棟内を歩行できます * 圧迫止血している手は、力をいれたり、 手をつかないようにしてください ○足の付け根からの検査・治療 ベッドで病室に戻ります ◇【アンギオシール使用の場合】2時間は穿刺した側の足を曲げないで下さい 2時間後から尿の管を抜き、歩行できます ◇【アンギオシール使用しなかった場合】(4時間・6時間)時間は穿刺した側の足を曲げないで下さい ・(4時間・6時間)後から尿の管を抜き歩行ができます	・自由です
清潔		・入浴、シャワー浴ができます			退院日からシャワーができます
説明 指導	・検査・治療について説明します ・検査・治療の同意書は自宅をよく読んで サインをし、入院前に外来に提出してください	・胸痛や動悸が起きた場合はすぐに 教えてください ・検査・治療について不安に思っていることは スタッフにお聞ください	・義歯、時計、指輪等のアクセサリは外してください ・シャツは脱いでください (女性の方はブラジャーも外してください) ・家族の方は放射線科受付の前でお待ちください (検査・治療終了後に循環器担当医から説明があります) ・検査・治療中、痛みや気分が悪い時は我慢せず伝えてください	・検査・治療後、医師より結果説明があります ・胸痛や動悸が起きた場合はすぐに教えてください ・腰痛等の痛みがある時はお薬を使うことができますので 我慢せず教えてください	退院後の生活について ・何か不安や心配事があればご相談ください ・シャワー使用時は傷口をこすらないようにしてください ・検査・治療2日後から入浴ができます * 血液をサラサラにする薬(血を固まりにくくする薬)は 中止しないでください 内視鏡を受ける時、抜歯する時など薬を中止する場合、 必ず事前に受持医にご相談ください ・日常生活については、受持医に相談してください

※ 状況によって予定が変更になる場合があります。

練馬総合病院:放射線科,看護部

改訂日:令和3年11月7日