

外科 << 治癒切除不能な胆道癌 >>

レジメン名

GCD(GEM+CDDP+デュルバルマブ) 療法

3週1コース(最大8コース)、その後はイミフィンジ1500mg 4週毎 維持療法へ

薬剤名	レジメン量	計算量	実投与量	投与スケジュール
抗がん剤				1 8 15 22 (1)
イミフィンジ [®] 注(500mg)	1500mg/body	mg	mg	↓ 休 休 ↓
シスプラチン注(10/25/50mg)	25mg/m ²	mg	mg	↓ ↓ 休 ↓
ゲムシタビン注(200/1000mg)	1000mg/m ²	mg	mg	↓ ↓ 休 ↓
前投薬				1 8 15 22 (1)
デキサード [®] 注(1.65/6.6mg)	6.6mg	6.6 mg	mg	↓ ↓ 休 ↓
グラニセトロンバッグ1mg	1mg	1 mg	mg	↓ ↓ 休 ↓
硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	0.5A	0.5 A	A	↓ ↓ 休 ↓
自宅で内服				1 2 . . . 8 9 . . . 15 22 (1)
(必要に応じて)デカドロン [®] 錠	1日8mg (1回4mg 1日2回)	1日8mg (1回4mg 1日2回)	1日 mg	3→ 3→ 休 ↓