

婦人科

《子宮平滑筋肉腫》

レジメン名

<1コース>

ドキソルビシン(アドリアシン)療法

3週間を1クールとする

薬剤名	レジメン量	計算量	実投与量	投与スケジュール
抗がん剤				1 2 3 4 22(1)...
ドキソルビシン注(10/50mg)	60~75 mg/m ²	mg	mg	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
前投薬				1 2 3 4 22(1)...
デキサート注(6.6/1.65mg)	9.9 mg	mg	mg	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
パロノセトロン注	1 V	V	V	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
内服				1 2 3 4 22(1)...
アプレピタントカプセル	125 mg/日	125 mg/日	mg/日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
	80 mg/日	80 mg/日	mg/日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
デカドロン錠0.5mg	8 mg/日 2×	8 mg/日 2×	mg/日 2×	↓ ↓ ↓ ↓ ↓
必要に応じて オランザピン錠2.5mg	1回5mg (1日1回 5mg/日)	5 mg/日	mg/日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓