## 婦人科

## ≪ 進行・再発の子宮体癌

>>

レジメン名

## Durvalumab (イミフィンジ®)+TC(PTX+CBDCA) 療法

<1コース>

化学療法期:3週1コース、6コースまで投与

血清クレアチニン値

mg/dL

薬剤名	<u></u> レジメン量		計算量		実投与量	投与スケジュール	
抗がん剤						1 2 3	4 · · · · 22(1) · · ·
デュルバルマブ(イミフィンジ <sup>®</sup> )注120/500mg	1120	) mg		mg	mg	$\downarrow$	$\downarrow$
パクリタキセル100/30mg(PTX)	175	$mg/m^2$		mg	mg	$\downarrow$	$\downarrow$
カルボプラチン50/150/450mg(CBDCA)	AUC	;	女 性	mg	mg	$\downarrow$	1
	Calvert式*		Į				
前投薬							
デキサート注(1.65/6.6mg)	9.9	mg	9.9	mg	mg	1	1
グラニセトロン注1mg/生食50mL	1	mg	1	mg	mg	$\downarrow$	$\downarrow$
ポララミン <sup>®</sup> 5mg注	1	Α	1	Α	Α	$\downarrow$	$\downarrow$
ファモチジン注20mg	1	Α	1	Α	Α	$\downarrow$	$\downarrow$
内服						1 2 3	4 22(1)
アプレピタントカプセル	125	mg	125	mg	mg	ļ	<b>↓</b>
アプレピタントカプセル	80	mg	80	mg	mg	↓ ↓	
デカドロン錠(0.5mg)	4	mg/日	<b>4</b> m	g/日	mg/日	l I	
	1日2回	2 mg/回				↓ ↓	<b>*</b>